На правах рукописи

**Черимичкина
Наталья Александровна**

**ОСНОВНО-КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ОДНОРЕАКТОРНЫЕ СИНТЕЗЫ
НОВЫХ КАРБО- И ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
С УЧАСТИЕМ КЕТОНОВ И АЦЕТИЛЕНА**

Специальность 02.00.03 – органическая химия

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени
кандидата химических наук

Иркутск – 2017

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Иркутском институте химии им. А. Е. Фаворского
Сибирского отделения РАН

Научный руководитель

доктор химических наук
Шмидт Елена Юрьевна

Официальные оппоненты:

Третьяков Евгений Викторович,
доктор химических наук,
ФГБУН Новосибирский институт
органической химии им. Н. Н. Ворожцова
СО РАН, заместитель директора по науке,
лаборатория изучения нуклеофильных и
ион-радикальных реакций, заведующий

Курохтина Анна Аркадьевна,
кандидат химических наук, доцент,
ФГБОУ ВО Иркутский государственный
университет, кафедра физической и
коллоидной химии, доцент

Ведущая организация

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический
университет им. С. М. Кирова

Защита состоится 17 октября 2017 года в 9 часов на заседании
диссертационного совета Д 003.052.01 на базе Иркутского института химии
им. А. Е. Фаворского СО РАН по адресу: 664033, Иркутск, ул. Фаворского, 1.

С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке
Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН (ИрИХ СО РАН) и на
сайте <http://www.irkinstchem.ru>.

Отзывы на автореферат в 2-х экземплярах просим направлять по адресу:
664033, Иркутск, ул. Фаворского, 1, ученому секретарю диссертационного совета; e-
mail: dissovet@irioch.irk.ru.

Автореферат разослан «___» сентября 2017 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
к.х.н.

Арбузова Светлана Николаевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Поиск простых и эффективных методов синтеза сложных молекул из легкодоступных прекурсоров является одной из основных и наиболее устойчивых тенденций в органической химии. В этом направлении весьма привлекательными являются каскадные реакции, сопровождающиеся образованием нескольких углерод-углеродных связей и приводящие к новым синтетически и фармацевтически важным карбо- и гетероциклическим системам. Ацетилен, благодаря его высокой и многогранной реакционной способности, является особенно ценным строительным блоком для таких реакций. Это связано в значительной степени со способностью ацетилена выступать одновременно в качестве нуклеофильного и электрофильного реагента. В присутствии супероснований (например, гидроксид или алкоксид щелочного металла/полярный негидроксильный растворитель) эта двойственная реакционная способность ацетилена наиболее выражена, отчасти, вследствие его более глубокого депротонирования. Кроме того, анионы, атакующие тройную связь, а также ацетиленид-ионы, в присутствии супероснований являются более реакционноспособными в силу их частичной десольватации. Сочетание этих двух конкурирующих процессов (депротонирование ацетилена и нуклеофильное присоединение к тройной связи) обеспечивает возможность протекания новых реакций, представляющих собой одnoreакторные многоступенчатые сборки сложных структур с участием нескольких молекул.

К каскадным сборкам такого типа относятся недавно открытые реакции с участием ацетилена и кетонов в присутствии супероснований, в результате которых две простые молекулы (ацетилен и кетон), претерпевая каскад превращений селективно (в ряде случаев диастереоселективно) образуют сложные циклические структуры (гексагидроазулены, ацилтерфенилы, диоксибициклооктаны, фураны, бензоксепины и др.).

Настоящая диссертация представляет собой дальнейшее развитие этого перспективного подхода к синтезу циклических структур на основе реакций ацетилена и кетонов в суперосновных системах.

Цель работы – поиск и систематическое изучение новых основно-каталитических каскадных реакций ацетилена с кетонами и разработка на их основе селективных одnoreакторных синтезов практически важных карбо- и гетероциклических систем, установление границ применимости новых реакций, определение основных факторов, контролирующих их хемо-, регио- и стереоселективность.

Исследования, проведенные в рамках диссертационной работы, выполнены в соответствии с планами НИР Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН по теме: «Разработка новых атом-экономных реакций ацетилена и его замещенных и производных, фундаментальных гетероциклов, элементного фосфора, фосфорорганических и фосфорхалькогеноорганических соединений, в том числе с участием активированных анионов, цвиттер-ионов, карбенов и радикалов с целью получения физиологически активных веществ и инновационных материалов для передовых технологий» (№ гос. регистрации 01201281991). Отдельные результаты были получены при финансовой поддержке грантами Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ РФ (НШ-7145.2016.3), Российского научного фонда (№ 14-13-00588) и Российского фонда фундаментальных исследований (№№ 11-03-00270, 12-03-31075, 16-03-00449).

Научная новизна и практическая значимость работы. Разработан одnoreакторный синтез алкилзамещенных 7-метилен-6,8-диоксабицикло[3.2.1]октанов на основе каскадной реакции диалкил(циклоалкил)кетон^{ов} с ацетиленом в суперосновной системе КОН/ДМСО, открывающий прямой путь к новым производным известных феромонов насекомых и их ранее недоступным тетрациклическим аналогам.

Открыта одnoreакторная диастереоселективная сборка ацилциклопентенолов из кетон^{ов} и ацетилена, протекающая в системе КОН/ДМСО. С использованием реакции 1,5-дикетон^{ов} с ацетиленами разработан одnoreакторный синтез функционализированных циклопентенов – перспективных строительных блоков для тонкого органического синтеза.

Найдена одnoreакторная сборка фуранов, сопряженных с ароматическими, гетероароматическими и металлоценовыми системами, из стерически затрудненных кетон^{ов} и ацетилена в системе КОН/ДМСО.

Личный вклад автора. Представленные в диссертации результаты получены лично автором или при его непосредственном участии. Соискатель самостоятельно планировал и выполнял эксперимент, анализировал результаты, участвовал в интерпретации спектральных данных, в подготовке и написании публикаций.

Апробация работы и публикации. Отдельные результаты настоящего исследования были представлены на Всероссийской молодежной научной конференции «Актуальные проблемы органической химии» (Шерегеш, 2015), на конкурсе проектов молодых ученых ИрИХ СО РАН в рамках «III Научных чтений, посвященных памяти ак. А. Е. Фаворского» (Иркутск, 2015), на школе-конференции молодых ученых с международным участием «V Научные чтения, посвященные памяти ак. А. Е. Фаворского» (Иркутск, 2017). По материалам диссертации опубликовано 9 статей и тезисы 2 докладов.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 118 страницах. Первая глава – обзор литературы, посвященный открытию и разработке новой общей реакции нуклеофильного присоединения кетон^{ов} к ацетиленам и ее использованию в синтезе карбо- и гетероциклических систем. Результаты собственных исследований обсуждаются во второй главе, необходимые экспериментальные подробности приведены в третьей главе. Завершается рукопись выводами и списком цитируемой литературы (246 наименований).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Одnoreакторный синтез 7-метилен-6,8-диоксабицикло[3.2.1]октанов из диалкил(циклоалкил)кетон^{ов} и ацетилена

Недавно было показано [Trofimov V. A. et al. *Eur. J. Org. Chem.* **2009**, 5142], что алкил(гет)арилкетон^ы реагируют с ацетиленом в суперосновных системах МОН/ДМСО (М – щелочной металл), диастереоселективно образуя 7-метилен-6,8-диоксабицикло[3.2.1]октаны (Схема 1).

Схема 1

Особенность реакции заключается в том, что в одну препаративную стадию образуются три С-С- и две С-О-связи с высокой хемо- (учитывая многочисленность возможных первичных и промежуточных реакций кетонов и ацетилена в присутствии оснований) и диастереоселективностью. Эта реакция была изучена только на 5-ти примерах однотипных кетонов (алкилароматические кетоны). Практическая важность образующихся продуктов (производные феромонов насекомых семейства фронталина и гормонов теплокровных, ценные строительные блоки для органического синтеза), а также уникальность самой реакции диктуют необходимость ее дальнейшего систематического исследования. Например, диалкилкетоны в этой реакции изучены не были, между тем, именно алкилзамещенные 6,8-диоксабицикло[3.2.1]октаны являются наиболее близкими по структуре к природным представителям этих молекул. Настоящий раздел диссертации посвящен изучению реакции диалкил- и циклоалкилкетонов с ацетиленом в присутствии супероснования.

1.2. Оптимизация условий синтеза на примерах пинаколина и циклогексанона

Для разработки препаративного синтеза алкилзамещенных 7-метилен-6,8-диоксабицикло[3.2.1]октанов был проведен поиск оптимальных условий реакции и процедур выделения целевых продуктов. Для этого были выбраны реакции с ацетиленом пинаколина **1a** (как представителя диалкилкетонов, Табл. 1) и циклогексанона **1e** (как представителя циклоалкилкетонов, Табл. 2). Эксперименты проводились в системе КОН/ДМСО в избытке ацетилена (под давлением).

Таблица 1. Реакция пинаколина **1a** с ацетиленом в системе КОН/ДМСО: влияние условий на выход бициклооктана **2a**

Опыт	Мольное соотношение КОН: 1a	T, °C	t, ч	Конверсия кетона 1a , % ^a	Бициклооктан 2a , % ^b	Спирт 3a , % ^b
1	1:1	70	0.5	98	17	33
2	1:1	80	0.5	100	84	-
3	1:1	90	0.5	100	72	-
4	0.5:1	90	1.0	62	27	31
5	0.5:1	90	3.0	87	41	38

^a По данным спектров ЯМР ¹H реакционной смеси. ^b Препаративный выход после перегонки с паром.

Бициклооктан **2a** образуется селективно (выход 84%, Табл. 1, опыт 2) при мольном соотношении КОН : **1a** = 1 : 1 (80 °C, 0.5 ч). В этих условиях конверсия исходного кетона **1a** близка к 100%. При более низкой температуре (опыт 1) и меньшем содержании КОН (опыты 4, 5) выход бициклооктана **2a** уменьшается. Реакционная смесь в этих случаях содержит значительное количество третичного ацетиленового спирта **3a** (продукт этинилирования пинаколина **1a**, Схема 2).

Схема 2

Оптимальной процедурой выделения бициклооктана **2a** является перегонка реакционной смеси с паром с последующей вакуумной перегонкой органического слоя дистиллята.

Таблица 2. Реакция циклогексанона **1e** с ацетиленом в системе КОН/ДМСО: влияние условий на выход бициклооктана **2e**

Опыт ^a	T, °C	t, ч	2e , % ^b	Побочные продукты, % ^b
1	70	0.5	17	4e , 6
2	70	1.0	51	-
3	80	0.5	следы	3e , 40+ 4e , 11
4	90	1.0	следы	3e , 12+ 4e , 40

^a Мольное соотношение КОН:**1e** во всех опытах составляло 1:1. ^b Препаративный выход после колоночной хроматографии (SiO₂, бензол).

Лучший выход бициклооктана **2e** достигает лишь 51% (Табл. 2, опыт 2). Это связано, вероятно, с более высокой склонностью кетона **1e** к процессам автоконденсации в присутствии сильного основания. Другие изменения условий синтеза способствуют образованию ацетиленового спирта **3e**, а также его винилового эфира **4e** (Схема 3).

Схема 3

Во всех опытах (Табл. 2), согласно данным спектров ЯМР ¹H, в реакционных смесях не наблюдалось заметного количества исходного циклогексанона **1e**, т.е. его конверсия была практически полной. Целевой продукт **2e** лучше выделять колоночной хроматографией.

1.3. Реакция диалкил- и циклоалкилкетонов с ацетиленом в суперосновной системе КОН/ДМСО. Основные закономерности и особенности

Основываясь на результатах, полученных на модельных превращениях (Табл. 1, 2), изучена реакция диалкил- и циклоалкилкетонов **1** с ацетиленом в условиях, близких к оптимальным для кетонов **1a,e** (Схема 4).

Эксперименты проводились под давлением ацетилена в системе КОН/ДМСО при эквимольном соотношении кетона **1** и щелочи. В большинстве случаев реакционные смеси (по данным спектров ЯМР ¹H) содержали только бициклооктаны **2**. Более низкие выходы соединений **2в-к**, очищенных колоночной хроматографией, по сравнению с бициклооктанами **2a,b** (получены перегонкой с паром), возможно, связаны с их частичным превращением на поверхности SiO₂.

Важной особенностью реакции является ее стереоселективность (бициклооктаны **2a-г** образуются в виде одного диастереомера). Тетрациклические производные **2д-к** состоят из нескольких изомеров (с преобладанием одного). Эта изомерия, вероятно,

обусловлена различным сочленением алифатических циклов с бициклооктановым скелетом (по аналогии с изомерией декалина).

Схема 4

* Основной изомер

Схема образования бициклооктанов **2** (Схема 5), очевидно, включает несколько каскадных превращений, первым из которых является присоединение кетона как *S*-нуклеофила к ацетилену с образованием 2-пропенилкетона, прототропно изомеризующегося в сопряженный 1-пропенилкетон **A**.

Схема 5

Следующая стадия – присоединение второй молекулы кетона **1** к активированной двойной связи интермедиата **A** и образование 1,5-дикетона **B** (Схема 6).

Схема 6

Далее следует стадия присоединения ацетиленид-иона к одной из карбонильных групп 1,5-дикетона **B** с образованием ацетиленового кетоспирта **B** (реакция Фаворского, Схема 7).

Схема 7

Завершают сборку бициклооктанов **2** две последовательные циклизации – обратимое образование полуацетала **Г** (внутримолекулярное присоединение гидроксильной группы к карбонильной функции интермедиата **B**) и нуклеофильное присоединение образовавшейся гидроксильной группы к тройной связи (Схема 8).

Диастереоселективность образования бициклооктанов **2** обеспечивается, очевидно, на завершающей стадии ($\Gamma \rightarrow 2$), которая возможна только тогда, когда гидроксильная группа и тройная связь находятся в *цис*-ориентации относительно искаженной плоскости полуацетала Γ . Равновесный характер образования полуацетала Γ способствует его полному превращению с образованием продукта **2** в виде одного диастереомера.

В представленной последовательности превращений проявляется двойственная реакционная способность ацетилена – его способность попеременно выступать как в качестве электрофила (Схемы 5, 8), так и в качестве нуклеофила (Схема 7).

Еще одной практически важной особенностью синтеза бициклооктанов **2** является возможность его реализации при атмосферном давлении ацетилена. Например, при проведении реакции пинаколина **1a** с ацетиленом в проточном реакторе (KOH/DMCO, 80 °C, 1 ч), бициклооктан **2a** был выделен с выходом 41% (конверсия пинаколина **1a** ~70%). Синтез при атмосферном давлении является более безопасным и технологичным и может быть реализован в любой лаборатории.

Таким образом, изучена катализируемая супероснованием KOH/DMCO реакция диалкил- и циклоалкилкетонов с ацетиленом и на ее основе разработан одnoreакторный селективный синтез алкилзамещенных 7-метил-6,8-диоксабицикло[3.2.1]октанов.

2. Однореакторный синтез 3-ацилциклопентен-2-ол-1-ов из кетонов и ацетиленов

В ходе исследования синтеза бициклооктана **2л** из ацетофенона и ацетилена в системе KOH/DMCO, было замечено, что реакция сопровождается образованием минорного продукта **5a**, который был выделен с выходом <1% (Схема 9).

Схема 9

Структура соединения **5a** была установлена на основании данных РСА (Рис. 1) и подтверждена методом ЯМР (Рис. 2).

Рис. 1. Структура циклопентенола **5a** по данным РСА Рис. 2. Основные NOESY корреляции в ЯМР спектре циклопентенола **5a**

Ацилциклопентенол **5a** образован, как и бициклооктан **2л**, из двух молекул ацетофенона **1л** и двух молекул ацетилен и выделен в виде одного диастереомера.

Функционализированные циклопентены – это прекурсоры и интермедиаты в синтезе анти-раковых препаратов. Циклопентенольный фрагмент входит в состав антибиотиков и анти-ВИЧ препаратов. Однако введение заместителей в циклопентеновое кольцо до сих пор остается синтетической проблемой. Ценность ацилциклопентенолов как прекурсоров лекарств, а также известные трудности их синтеза, стимулировали наши дальнейшие исследования этой минорной реакции (Схема 9), которая (при условии оптимизации) могла бы обеспечить удобный путь к функционализированным циклопентенам из простых реагентов. Изучению возможности переориентации основно-каталитической реакции кетонов с ацетиленом в сторону образования циклопентенолов и разработке селективного одnoreакторного синтеза ацилциклопентенолов посвящен настоящий раздел диссертации.

2.1. Оптимизация условий синтеза на примере ацетофенона

Поиск условий селективного образования циклопентенолов **5** проводился на примере реакции ацетофенона **1л** с ацетиленом под давлением.

Первоначально исследовалось влияние природы катиона щелочного металла в суперосновных системах гидроксид (алкоксид) щелочного металла/ДМСО на эффективность (суммарный выход изомеров **2л+5a**) и селективность (соотношение **2л:5a**) реакции (Табл. 3).

Таблица 3. Реакция ацетофенона **1л** с ацетиленом: эффекты природы супероснования MOR/ДМСО на выход продуктов и их соотношение^a

MOR	Выход 2л+5a , % ^b	Мольное соотношение 2л:5a ^B
LiOH		нет реакции
LiOMe	64	29:71
NaOH	80	40:60
NaOMe	44	77:23
NaOEt	50	71:29
NaOBu ^t	42	77:23
KOH·0.5H ₂ O	94	99:1
KOBu ^t	42	67:33
RbOH·2H ₂ O	40	100:0
CsF/LiOH	38	77:23

^a Условия реакции: ацетофенон **1л** (17 ммоль, 2.00 г), мольное соотношение MOR:**1л**=1:1, ДМСО (25 мл), 70 °С, 15 мин. ^b Препаративный выход. ^B Определено по спектрам ЯМР ¹H.

Оказалось, что наибольшей каталитической активностью в выбранных условиях (Табл. 3) обладают суперосновные системы KOH·0.5H₂O/ДМСО и NaOH/ДМСО. Неплохая активность наблюдается у пары LiOMe/ДМСО. Триада CsF/LiOH/ДМСО в этих условиях не обеспечивает высокого суммарного выхода изомеров.

Далее были изучены эффекты второго компонента супероснований (растворителя) на основе KOH и показано (Табл. 4), что ДМСО является наиболее

активным вторым компонентом (суммарный выход продуктов 94%), однако, в этих условиях циклопентенол **5a** образуется лишь в следовых количествах (~ 1%).

Таблица 4. Реакция ацетофенона **1л** с ацетиленом: эффекты второго компонента суперосновной системы на основе КОН на выход продуктов и их соотношение^a

КОН/растворитель	Выход 2л+5a , (%) ^b	Мольное соотношение 2л:5a ^B
КОН·0.5H ₂ O/ДМСО	94	99:1
КОН·0.5H ₂ O/ДМСО/MeOH	32	67:33
КОН·0.5H ₂ O/ДМФА	10	0:100
КОН·0.5H ₂ O/бензол	11	100:0
КОН·0.5H ₂ O/ТГФ	6	100:0

^a Условия реакции: ацетофенон **1л** (17 ммоль, 2.00 г), КОН (17 ммоль, 1.11 г), растворитель (25 мл), 70 °C, 15 мин. ^b Препаративный выход. ^B Определено по спектрам ЯМР ¹H.

Затем была проведена оценка влияния содержания КОН, температурных и временных режимов процесса на эффективность и селективность реакции (Табл. 5).

Таблица 5. Реакция ацетофенона **1л** с ацетиленом в системе КОН/ДМСО: влияние условий реакции на выход продуктов и их соотношение^a

Опыт	Мольное соотношение КОН:1л	T, °C	t, мин	Конверсия 1л, %	Выход 2л+5a, % ^b	Мольное соотношение 2л:5a ^B
1	1:1	70	15	100	94	99:1
2	1:1	50	15	100	84	89:11
3	1:1	40	15	78	63	77:23
4	1:1	30	15	46	41	50:50
5	1:2	70	15	100	90	91:9
6	1:4	70	15	100	92	91:9
7	1:8	70	15	100	93	83:17
8	1:15	70	15	88	87	38:62
9	1:15	70	60	93	75	38:62
10	1:15	70	180	94	82	37:63
11	1:15	70	240	96	85	36:64
12	1:15	70	480	100	98	38:62

^a Условия реакции: ацетофенон **1л** (17 ммоль, 2.00 г), ДМСО (25 мл). ^b Препаративный выход. ^B Определено по спектрам ЯМР ¹H.

При значительном уменьшении содержания КОН в реакционной смеси (мольное соотношение КОН:ацетофенон **1л**=1:15, что соответствует 6.5 моль% КОН по отношению к ацетофенону **1л**) происходит резкое изменение соотношения продуктов в пользу циклопентенола **5a** (Табл. 5, опыты 8-12). Понижение температуры реакции от 70 до 30 °C (опыты 1-4) также способствует образованию циклопентенола **5a**, однако при этом уменьшается конверсия ацетофенона **1л**. При температуре 70 °C

(мольное соотношение KOH:1л=1:15, 8 ч) препаративный выход циклопентенола **5a** достигает 63% при полной конверсии исходного кетона (опыт 12).

Таким образом, для преимущественного образования циклопентенола **5a** требуется малое количество KOH (6.5 моль%). В то же время, для достижения максимально высокого выхода бициклооктана **2л** необходима в 15-раз более высокая концентрация основания (100 моль%).

Найдены условия препаративного разделения бициклооктана **2л** и циклопентенола **5a** из их смеси (колоночная хроматография, основной Al₂O₃).

2.2. Реакция метиларил(гетарил)кетонов с ацетиленом в системе KOH/DMCO. Основные закономерности и особенности

Для определения границ применимости найденной реакции и разработки препаративно приемлемого синтеза ацилциклопентенолов **5**, изучена реакция кетонов **1м-п** с ацетиленом в условиях, близких к оптимальным для синтеза циклопентенола **5a** (Схема 10).

Схема 10

Циклопентенолы **5б-г** образуются из метил(гет)арилкетонов **1** с выходом 51-63%. Конверсия исходных кетонов **1** была полной. Реакционные смеси во всех опытах содержали от 17% до 41% бициклооктанов **2**, которые отделялись от целевых продуктов колоночной хроматографией. Для достижения максимального выхода циклопентенола **5г** (55%) из 2-ацетилтиофена и ацетилена потребовалось большее количество основания (50 моль%) и более высокая температура (80 °C).

Образование циклопентенолов **5**, как и сборка бициклооктанов **2**, начинается с нуклеофильного присоединения кетона **1** к ацетилену (Схема 11). Далее имеет место прототропная изомеризация аддукта и присоединение второй молекулы кетона **1** к двойной связи α,β-ненасыщенного кетона **A**. Затем следует присоединение второй молекулы ацетилена (ацетиленид-иона) к одной из карбонильных групп 1,5-дикетона **B**. Замыкание циклопентанового кольца происходит в результате атаки углерод-центрированного аниона на тройную связь в интермедиате **B**. Прототропная изомеризация аниона **Г** и протонирование завершают реакцию.

Таким образом, в ходе сборки циклопентенолов **5** в одну препаративную стадию образуются четыре углерод-углеродные связи. И в этой последовательности превращений ацетилен также попеременно ведет себя и как электрофил (стадии **1**→**A**, **B**→**Г**), и как нуклеофил (стадия **B**→**B**).

Важной особенностью реакции является ее диастереоселективность (циклопентенолы **5** образуются в виде одного диастереомера). Это может быть связано с темплатным эффектом катиона калия, который ориентирует енолизируемую карбонильную и гидроксильную группы по одну сторону замыкающегося цикла в интермедиате **B**.

Реакция 4-ацетилпиридина **1o** с ацетиленом протекает с образованием циклопентенола **6a** (Схема 10), т.е., в данном случае имеет место элиминирование пиридоильной функции. Это, вероятно, является результатом атаки гидроксид-иона на карбонильный атом углерода в циклопентеноле **5o**, что приводит к расщеплению связи C3-C(O) и образованию циклопентенола **6a** и 4-пиридинкарбоновой кислоты (Схема 12). Последняя была выделена с выходом 32% после подкисления реакционной смеси.

Схема 12

Образование циклопентенолов **5** имеет место только в случае метиларил(гетарил)кетонов. При взаимодействии с ацетиленом других алкил(гет)ароматических кетонов, циклопентенолы **5** не образуются даже в следовых количествах – происходит селективное образование 7-метилен-6,8-диоксабицикло[3.2.1]октанов **2**. Вероятная причина заключается в пространственных затруднениях, возникающих при атаке разветвленного (стерически экранированного) карбанионного центра на ацетиленовый фрагмент в интермедиате **B** (Схема 11).

Для подтверждения схемы образования ацилциклопентенолов **5** (Схема 11), изучена реакция 1,5-дикетонов **7a-в** (предполагаемые интермедиаты **B**) с ацетиленом и фенилацетиленом в системе КОН/ДМСО (Табл. 6).

Из серии экспериментов были найдены условия (50 моль% КОН, 70 °С, 3 ч), в которых достигается полная конверсия 1,5-дикетонов **7** и обеспечивается максимально высокий выход циклопентенолов. Сборка циклопентенолов из 1,5-дикетонов **7** и ацетиленов также протекает с высокой диастереоселективностью.

Выход ацилциклопентенола **5a** (65%, Табл. 6), полученного из 1,5-дикетона **7a** и ацетилена, сопоставим с выходом **5a** (63%, см. раздел 2.1.), выделенным из продуктов реакции ацетофенона **1л** с ацетиленом.

Реакция 1,5-дикетонов **7a,в** с фенилацетиленом (Табл. 6) сопровождается частичным деацилированием ацилциклопентенолов **5e,з** и образованием циклопентенолов **6b,в** (аналогично образованию циклопентенола **6a** по Схеме 12).

Таблица 6. Реакция 1,5-дикетонов **7а-в** с ацетиленами в системе КОН/ДМСО.
Синтез цикlopентенолов **5,6**

1,5-Дикетон 7	Ацетилен	Цикlopентенол, % ^a
7a	HC≡CH	5a , 65
7б	HC≡CH	5д ^б , 36
7a		5e , 13 + 6б , 40
7б		5ж , 20 + 8 , 50
7в		5з , 66 + 6в , 25

^a Препаративный выход после колоночной хроматографии. ^б Основной диастереомер, соотношение диастереомеров = 4 : 1.

Из продуктов реакции 1,5-дикетона **7б** с фенилацетиленом были выделены ожидаемый ацилциклопентенол **5ж** (выход 20%) и цикlopентадиен **8** (выход 50%, Табл. 6). Последний, по-видимому, является продуктом деацилирования и дегидратации ацилциклопентенола **5ж**. Движущей силой дегидратации промежуточного цикlopентенола **6ж**, вероятно, является образование сопряженного с двумя бензольными кольцами цикlopентадиена **8** (Схема 13).

Таким образом, открыта и систематически изучена катализируемая супероснованием КОН/ДМСО одnoreакторная диастереоселективная сборка функционализированных циклопентенолов из двух молекул кетона и двух молекул ацетилен. Разработан одnoreакторный синтез ацилциклопентенолов на основе реакции 1,5-дикетонов с ацетиленами, которая подтверждает схему образования ацилциклопентенолов из кетонов и ацетилен, а также (благодаря доступности 1,5-дикетонов и разнообразию монозамещенных ацетиленов) обеспечивает структурное разнообразие функционализированных циклопентенолов.

Важной особенностью основно-каталитических самосборок двух молекул кетонов и двух молекул ацетилен является возможность их переориентации в сторону преимущественного образования либо 7-метилен-6,8-диоксабицикло[3.2.1]октанов **2**, либо ацилциклопентенолов **5**.

3. Одnoreакторный синтез замещенных фуранов из стерически затрудненных кетонов и ацетилен

Неожиданно было найдено, что реакция ацетилен и кетонов с объемными заместителями в системе КОН/ДМСО завершается образованием замещенных фуранов, при этом ожидаемые бициклооктаны **2** или циклопентенолы **5** не были обнаружены даже в следовых количествах.

Поскольку фураны – это структурные фрагменты многих биологически активных природных соединений, лекарственных средств, а также важные интермедиаты органического синтеза – поиск и разработка простых и селективных методов их получения из доступных реагентов остаются актуальными. Настоящий раздел диссертации посвящен исследованию основно-каталитической реакции стерически затрудненных кетонов с ацетиленом и разработке на ее основе селективного синтеза фуранов с редким набором заместителей.

3.1. Оптимизация условий синтеза на примере мезитилметилкетона

Для разработки условий, обеспечивающих эффективность и селективность образования фуранов, на примере реакции мезитилметилкетона **1p** с ацетиленом проведен скрининг активности суперосновных каталитических систем гидроксид щелочного металла (МОН)/ДМСО (Табл. 7). Реакция проводилась в избытке ацетилен (под давлением).

Таблица 7. Реакция мезитилметилкетона **1p** с ацетиленом в системе МОН/ДМСО: эффекты природы и содержания гидроксида щелочного металла на выход фурана **9a**

Опыт	МОН	Мольное соотношение МОН : 1p	T, °C	t, мин	Выход 9a , % ^a
1	LiOH	1 : 1	90	15	0
2	NaOH	1 : 1	70	15	2
3	NaOH	1 : 1	90	15	38
4	КОН·0.5H ₂ O	1 : 1	70	30	22
5	КОН·0.5H ₂ O	1 : 1	90	15	73
6	КОН·0.5H ₂ O	0.5 : 1	90	15	46
7	КОН·0.5H ₂ O	0.25 : 1	90	15	36
8	RbOH·2H ₂ O	1 : 1	90	15	23
9	CsOH·H ₂ O	1 : 1	90	15	37

^a Препаративный выход после колоночной хроматографии.

Максимальный выход 2-мезитил-4,5-диметил-фурана **9a** достигает 73% (Табл. 7, опыт 5) при проведении реакции в системе КОН/ДМСО при эквимольном соотношении кетона и щелочи (90 °С, 15 мин). В этих условиях обеспечивается полная конверсия исходного кетона **1p**. Другие гидроксиды щелочных металлов оказались менее активными в данной реакции.

3.2. Реакция стерически затрудненных кетонов с ацетиленом в системе КОН/ДМСО. Основные закономерности и особенности

В условиях, близких к оптимальным для синтеза фурана **9a** (КОН/ДМСО, мольное соотношение МОН : кетон **1**=1:1, 90 °С, 15 мин), изучена реакция ряда стерически затрудненных кетонов с ацетиленом (Схема 14).

Схема 14

Кетоны с объемными ароматическими, конденсированными ароматическими, гетероароматическим и металлоценовым заместителями толерантны к условиям реакции, что доказывает ее общий характер.

Выход продуктов ожидаемо зависит от природы заместителей в кетонах: из кетона **1у** с парациклофанильным заместителем фуран **9г** образуется с выходом 51%, в то же время из кетона **1с** с менее объемной мезитильной группой фуран **9б** был выделен с выходом 81%. Низкий выход фурана **9д** (24%) из 9-ацетилантрацена **1ф**, по-видимому, является следствием еще больших стерических препятствий для нуклеофильного присоединения образующегося карбаниона к ацетилену. Очевидно, что для этих кетонов требуется дополнительная оптимизация условий синтеза.

Структура продуктов доказана данными РСА монокристалла одного из представителей этого ряда (фуран **9з**, Рис. 3) и подтверждена спектрами ЯМР (Рис. 4).

Рис. 3. Структура фурана **9з** по данным РСА. Рис. 4. Основные NOESY и HMBC корреляции в ЯМР спектрах фурана **9з**.

Образование фуранов, очевидно, также начинается с нуклеофильного присоединения кетона **1** к ацетилену (Схема 15). Далее следует прототропная изомеризация β,γ -ненасыщенного кетона **A** и присоединение второй молекулы ацетилена (ацетиленид-иона) к электрофильной двойной связи аддукта **Б**. В данном случае имеет место конкуренция между объемным карбанионом кетона (см. Схемы 6 и 11 – образование бициклооктанов **2** и ацилциклопентенолов **5**, соответственно) и ацетиленид-ионом, которая в данном случае полностью разрешается в пользу последнего (Схема 15). Затем кислород-центрированный анион **В** внутримолекулярно атакует тройную связь. Образующийся дигидрофураниевый анион **Г** протонируется и прототропно изомеризуется в фуран **9**. Ацетилен и в этом каскаде превращений проявляет свою двойственную природу (стадии **1**→**A**, **В**→**Г** – ацетилен реагирует как электрофил, стадия **Б**→**В** – ацетилен реагирует как нуклеофил).

Схема 15

Приведенная выше схема (Схема 15) подтверждается выделением интермедиата **Б** (α,β -ненасыщенный кетон **10а**) из продуктов реакции кетона **1ц** с ацетиленом (КОН/ДМСО, 70 °С, 3 ч, Схема 16). Дальнейшее взаимодействие кетона **10а** с ацетиленом в условиях реакции (КОН/ДМСО, 90 °С, 15 мин) приводит к ожидаемому фурану **9ж** (выход 73%).

Реакция мезитилметилкетона **1р** с ацетиленом была успешно проведена при атмосферном давлении (проточный реактор, KOH/DMF, 90 °C, 3 ч). 2-Мезитил-4,5-диметил-фуран **9а** был выделен с выходом 57%.

Таким образом, обнаружена однореакторная сборка замещенных фуранов из одной молекулы стерически затрудненного кетона и двух молекул ацетилена в системе KOH/DMF.

Выводы

1. Систематически изучена катализируемая суперосновной системой KOH/DMF каскадная реакция диалкил- и циклоалкилкетонов с ацетиленом и на ее основе разработан однореакторный синтез алкилзамещенных 7-метилен-6,8-диоксабицикло[3.2.1]октанов, обеспечивающий прямой путь к новым производным феромонов насекомых и их ранее неизвестным тетрациклическим семействам.

2. Открыта однореакторная диастереоселективная сборка ацилциклопентенолов из кетонов и ацетилена в системе KOH/DMF. Доказано, что интермедиатами этой сборки являются 1,5-дикетоны.

3. На основе реакции 1,5-дикетонов с ацетиленами в системе KOH/DMF разработан однореакторный синтез ацилциклопентенолов – перспективных интермедиатов для тонкого органического синтеза и дизайна лекарств.

4. Установлено, что основными факторами, контролирующими направление основно-каталитических каскадных реакций двух молекул кетонов и двух молекул ацетилена и позволяющими селективно получать либо 7-метилен-6,8-диоксабицикло[3.2.1]октаны, либо ацилциклопентенолы, являются природа заместителей в кетоне, а также природа и концентрация катализирующего основания.

5. Обнаружена и систематически изучена каскадная реакция стерически затрудненных кетонов с ацетиленом в системе KOH/DMF и на ее основе разработан однореакторный синтез фуранов, сопряженных с объемными ароматическими, гетероароматическими и металлоценовыми системами – ценных интермедиатов для тонкого органического синтеза, дизайна лекарств и материаловедения.

Основные результаты работы изложены в следующих публикациях:

1. Schmidt, E. Yu. Base-catalyzed domino cyclization of acetylenes with ketones to functionalized cyclopentenones / E. Yu. Schmidt, B. A. Trofimov, I. A. Bidusenko, N. A. Cherimichkina, I. A. Ushakov, N. I. Protzuk, Y. V. Gatilov // *Org. Lett.* – 2014. – V. 16, № 15. – P. 4040–4043.
2. Трофимов, Б. А. Диастереоселективная самоорганизация молекул ацетиленов и ацетофенона в 1-бензоил-3-гидроксициклопентен в присутствии гидроксида калия / Б. А. Трофимов, Е. Ю. Шмидт, И. А. Бидусенко, И. А. Ушаков, Н. А. Черимичкина, Н. И. Процук // *ЖОрХ.* – 2014. – Т. 50, № 8. – С. 1223-1226.
3. Трофимов, Б. А. Сборка 1-гидрокси-2-циклопентена и 7-метилена-6,8-диоксабицикло[3.2.1]октана из молекул ацетиленов и 4-ацетилпиридина в суспензии КОН-DMSO / Б. А. Трофимов, Е. Ю. Шмидт, И. А. Бидусенко, Н. А. Черимичкина, И. А. Ушаков // *Изв. Ак. наук. Серия химическая.* – 2014. – № 10. – С. 2402-2404.
4. Schmidt, E. Yu. Furans conjugated with bulky aromatic systems: one-pot synthesis from ketones and acetylene / E. Yu. Schmidt, I. A. Bidusenko, N. A. Cherimichkina, I. A. Ushakov, T. N. Borodina, V. I. Smirnov, B. A. Trofimov // *Chem. Eur. J.* – 2015. – V. 21, № 45. – P. 15944-15946.
5. Schmidt, E. Yu. Expedient nonclassical reaction of acetylenes with ketones: controlling the switch between bicyclic ketal and cyclopentenol formation / E. Yu. Schmidt, I. A. Bidusenko, N. A. Cherimichkina, B. A. Trofimov // *Arkivoc.* – 2015. – V. vii. – P. 145-157.
6. Trofimov, B. A. Domino assembly of functionalized cyclopentenols from 1,5-diphenylpentane-1,5-dione and phenylacetylene in the KOH/DMSO suspension / B. A. Trofimov, E. Yu. Schmidt, I. A. Bidusenko, N. A. Cherimichkina // *Mendeleev Commun.* – 2015. – V. 25, № 1. – P. 17-18.
7. Трофимов, Б. А. Каскадная сборка фронтальных производных из циклогексанона и ацетиленов в системе КОН/ДМСО / Б. А. Трофимов, Е. Ю. Шмидт, И. А. Бидусенко, Н. А. Черимичкина // *ЖОрХ.* – 2015. – Т. 51, № 12. – С. 1832-1833.
8. Шмидт, Е. Ю. Неожиданная реакция 9-ацетилантрацена с ацетиленом в суспензии КОН/ДМСО / Е. Ю. Шмидт, И. А. Бидусенко, Н. А. Черимичкина, Б. А. Трофимов // *ЖОрХ.* – 2015. – Т. 51, № 10. – С. 1538-1539.
9. Schmidt, E. Yu. Polycyclic bridgehead acetals with enol functionality: one-pot assembly from aliphatic ketones and acetylene in KOH/DMSO suspension / E. Yu. Schmidt, I. A. Bidusenko, N. A. Cherimichkina, I. A. Ushakov, B. A. Trofimov // *Tetrahedron.* – 2016. – V. 72, № 30. – P. 4510-4517.
10. Черимичкина, Н. А. Однореакторный синтез функционализированных циклопентенов из кетонов и ацетиленов / Н. А. Черимичкина, И. А. Бидусенко, Е. Ю. Шмидт, Б. А. Трофимов // Тез. докл. Всероссийской молодежной научной школы-конференции «Актуальные проблемы органической химии». – Шерегеш. – 2015. – С. 88.
11. Бидусенко, И. А. Синтез полизамещенных фуранов из кетонов и ацетиленов в суперосновной системе КОН/ДМСО / И. А. Бидусенко, Н. А. Черимичкина, Е. Ю. Шмидт, Б. А. Трофимов. // Тез. докл. школы-конференции молодых ученых с международным участием «V Научные чтения, посвященные памяти ак. А. Е. Фаворского». – Иркутск. – 2017. – С. 117.

Основные результаты получены с использованием материально-технической базы Байкальского аналитического центра коллективного пользования СО РАН.